


❖ هدف از این پمفلت این است که به شما در مورد عمل جراحی ختنه و آنچه که باید قبل و بعد از عمل انجام دهید

اطلاعاتی بدهد

❖ ختنه چیست؟

❖ ختنه نوعی عمل جراحی است که در آن پوست روی ختنه گاه برداشته می شود



❖ چه اقداماتی قبل عمل لازم است؟

کودک شما معمولاً 4-8 ساعت قبل عمل چیزی از راه دهان نخواهد خورد.

نوع بیهوشی که داده می شود از نوع

بیهوشی عمومی است

❖ بعد عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟

❖ تا سه ساعت بعد عمل چیزی از راه دهان داده نخواهد نشد.

معمولاً در صورت نداشتن

مشکل خاص بعد از ظهر روز عمل بعد از

ادرار کردن و نداشتن استفراغ و

خونریزی مریض می باشد ..

❖ چطور می توانم از کودکم در منزل

مراقبت کنم؟

❖ در صورت داشتن پانسمان برای برداشتن

پانسمان بعد از سه روز کودک را در لگن

آب ولرم به مدت 15 دقیقه بنشانید هر

جای پانسمان کنده شد با قیچی ببرید و

محلهای چسبیده را در شستشویهای

بعدی بردارید.

❖ محل برش در ابتدا قرمز و حساس و

متورم بوده و در عرض 3 روز این

حساسیت کاهش می یابد

❖ محل ختنه را بعد برداشتن پانسمان با آب

ولرم ساده (بدون صابون) روزی دو بار

شسته و بعد پماد تتراسایکلین یا وازلین

روی محل بزنید. اینکار باعث نرمی و

تسکین درد ختنه می شود

❖ جهت تسکین درد طبق دستور پزشک از

استامینوفن هر 4-6 ساعت استفاده

کنید.

روز بعد عمل کودک خود را به حمام

ببرید



بیمارستان ولی عصر (عج) اقلید

ختنه

تهیه کننده: روح الله فارسی کارشناس ارشد پرستاری

بازنگری شده: تابستان ۱۴۰۱

منبع: پرستاری داخلی جراحی برونر ثودارت

کد سند: VAL-ASC-PAM/44/1 ب

محل ختنه دچار تورم شدید و خروج
چرک باشد
تبدار شده باشد
به نظر بی حال و مریض بیاید

از پوشانیدن شورت یا شلوار در روزهای
اول اجتناب کنید (از دامن استفاده کنید
).

در صورت استفاده از پوشک باید به
صورت شل بسته شود یا از یک سایز
بزرگتر پوشک استفاده کنید .

بخیه ها قابل جذب بوده و در عرض -10
7 روز اتفاق می افتد

❖ کی به پزشک مراجعه کنم؟

در این موارد باید فوراً به پزشک مراجعه کنید:

• اگر کودک ادرار قطره قطره داشته
باشد

• خونریزی از محل ختنه به صورت چکه
چکه داشته باشد